

# Внимание: птичий грипп.

По информации управления ветеринарии Ставропольского края на территории Российской Федерации резко ухудшилась эпизоотическая ситуация по заболеванию высокопатогенным гриппом птиц подтипа H5N1 у отстрелянных диких водоплавающих птиц.

На территории Ставропольского края находятся большие площади озимых культур (2,1 млн. га), являющиеся причиной отклонения дикой перелетной птицы от основных путей миграции на юг для отдыха и кормежки. При осенней миграции дикой водоплавающей птицы маршруты их перелета пролегают через все районы Ставропольского края. Кроме того, на территории края находятся незамерзающие водохранилища: Чограйское, Новотроицкое, Сенгилеевское, Егорлыцкое, Отказненское, на которых водоплавающая птица остается круглый год.

Угроза заноса вируса гриппа птиц на территорию края по прежнему сохраняется.

Основным источником заражения домашней птицы является контакт с перелетной дикой птицей. Дикая птица садится рядом с водоемами, начинает питаться, оставляет помет, а потом туда приходят домашние утки, гуси, и при кормлении вирус попадает в их организм. Болезнь проявляется резким снижением яйценоскости, поедания корма, жаждой, перед гибелью возникает синюшность гребня и сережек. У кур опущенные головы и закрытые глаза, слизистые оболочки покрасневшие, носовые отверстия заклеены слизью, дыхание хриплое, учащенное, температура тела 43-44° С. Наблюдаются также диарея, неврозы, судороги, манежные движения.

Необходимо знать, что вирус птичьего гриппа сохраняется в тушках при минус 20 градусов — 447 дней, при нулевой температуре — 287 дней, в куриных яйцах при комнатной температуре — 300 дней, в гниющих трупах птицы — месяц. При подтверждении заболевания птицы гриппом птиц, все поголовье уничтожается.

Для предотвращения заражения домашней птицы вирусом птичьего гриппа необходимо исключить ее контакт с дикой перелетной птицей (все поголовье должно содержаться в огороженных местах на территории домовладения). При обнаружении павшей или больной птицы, ее необходимо изолировать, при этом рот и нос должны быть защищены маской или респиратором, а руки — перчатками. После окончания работы вымывают руки с мылом, а одежду меняют на чистую. О всех случаях падежа или заболевания птицы необходимо информировать специалистов государственной ветеринарной службы по телефонам: 4-74-04, 4-74-01. Если после контакта с птицей у вас возникло острое респираторное заболевание, срочно обращайтесь к врачу.

По материалам отдела сельского хозяйства.